

DISPLASIA CERVICAL

Arizona Department of Corrections
Health Services Bureau

Inmate Wellness Program
HEP 1037S - Revised 08/08

Displasia Cervical

La displasia puede ocurrir a cualquier edad desde la pubertad en adelante. Suele darse en mujeres entre las edades de 25 y 35 años.

Los factores de riesgo incluyen:

- Relaciones sexuales a temprana edad (menor de 18 años de edad)
- Partos tempranos (menor de 16 años de edad)
- Múltiples compañeros sexuales.
- Enfermedades de transmisión sexual, especialmente el virus del papiloma humano (verrugas genitales), VIH e infecciones de herpes genital
- Uso de anticonceptivos orales

Durante un examen ginecológico, un proveedor de salud podrá encontrar que el tejido del cuello del útero (la parte que se abre hacia el vientre) está cambiado. Esta condición se llama displasia.

La displasia cervical puede ser el primer paso en la formación de cáncer en el cuello uterino. El cáncer cervical es el tercer tipo de cáncer más común en las mujeres.

SÍNTOMAS

Normalmente no hay síntomas visibles. Para encontrar alteraciones en el cuello, un proveedor de salud debe hacerle un examen Papanicolau (Pap). Por eso, el hacerse la prueba Papanicolau es la clave para diagnosticar esta condición.

PREVENCIÓN

El virus del papiloma humano (vea la hoja informativa sobre Verrugas Genitales), una infección de contagio sexual, es responsable de la mayoría, sino todos, los casos de cáncer


cervical. Esta enfermedad puede transmitirse mediante simple contacto de piel con un área infectada (ya sea entre genitales, o contacto entre manos y genitales).

Aparte de la abstinencia, la única protección segura es extirparse las verrugas antes de tener contactos íntimos. También, otras enfermedades de contagio sexual (ETS), como el SIDA, pueden relacionarse con la displasia cervical.

Conductas más sanas en las relaciones sexuales, incluyendo la monogamia y uso de condones, reducen el potencial de desarrollar la displasia cervical.

TRATAMIENTO

Usted debería presentarse para un examen pélvico una vez al año, de ser posible, puesto que el cáncer de cuello uterino puede ser tratado y curado cuando se diagnostica temprano. Si le han diagnosticado la displasia cervical, usted y su proveedor médico tendrán que decidir sobre el tratamiento.



Este dibujo muestra el útero, la cerviz (cuello) y otras partes del aparato reproductor de la mujer.

“Este documento es una traducción del texto original escrito en inglés. Esta no es una traducción oficial y no compromete a este Estado ni a ninguna subdivisión política de este Estado.”